

水稲の刈跡除草剤をJA特別価格でご案内

翌年の作業を軽減するために、稲刈取跡の雑草防除！

農林水産省登録 第23761号

デゾレート®AZ粒剤

®は株式会社カーリットの登録商標。

有効成分：塩素酸ナトリウム・・・50.0%

特長

除草剤分類 —

- 水稲の刈取跡、駐車場、宅地等でも使用できる除草剤です。
- 水稲刈取後の水田畦畔にも使えるようになりました。
- 即効性で根まで枯らし、散布後2～3ヶ月で種まきや定植ができます。
- 幅広い雑草に効果があり、特に竹、ササに高い効果を示します。ススキ、ヨモギ等にも有効です。

普通物になりました。(毒劇物に該当しないものを指している通称)

ご注文に印鑑や身分証明書は必要ございません。



(5kg入)

デゾレート 処理区

社内試験
散布日：2002年11月5日
撮影日：2003年4月28日
試験場所：岡山県倉敷市現地圃場

無処理区

通常価格：3,690円(税込) ⇒ 特別価格：3,200円(税込)
対象期間：9月10日～11月20日まで

水稲刈り跡散布例

収穫

デゾレート使用時期
刈取後(秋期雑草生育期)

処理後、1ヶ月は
すきこまない

耕起・代かきが楽

水稲には
影響なし

田植え

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

経済センター 0572-68-5128 ふれあいパーク浅野 0572-54-7788 多治見営農センター 0572-27-2914

デソレート® AZ粒剤

お庭に侵入するしつこい竹・ササにも効く！

庭木（根が張っている範囲）や花壇などの植栽地に散布しない！

散布可

散布不可

散布可

散布量（目安）

目通り	散布量
8cm未満	45～50kg/10a
8～12cm	50～60kg/10a
12cm以上	60kg/10a

- 竹が太いほど散布量を増やす！
- 葉が積もっていても大丈夫！
- 夏場の散布は避ける。

竹を枯らす！

無処理区

散布時期区分

推奨
(効果大)

効果中

推奨
(効果大)

効果小

秋期処理

春期処理

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

秋期処理 効果発現30～60日 枯死200日～280日 春期処理 効果発現15～30日 枯死30日～60日

※効果発現・枯死対象種：マダケ・モウソウチク（春季処理除く）・ゴサンチク

適用内容（抜粋）

2026年7月末日現在の適用内容

作物名	適用場所	適用雑草木名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	塩素酸塩を含む農薬の総使用回数
樹木等	公園、堤とう駐車場、道路運動場、宅地のり面等	一年生及び多年生雑草	雑草生育初期～中期	15～25kg/10a	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内 (全面土壌散布は1回以内、 但し当該処理をする場合には 雑草茎葉散布は1回以内)
		竹類	生育期	45～60kg/10a	1回	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布	
水稻 (水稻刈取跡)	水稻刈取跡	一年生雑草及び多年生イネ科雑草	水稻刈取後 (秋期雑草生育期)	20～25kg/10a	—	水稻刈取跡に全面土壌散布	—
		セリ		20～40kg/10a			
		オモダカ		30～40kg/10a			
水稻 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草及び多年生広葉雑草	水稻刈取後雑草生育期	20～40kg/10a	—	全面土壌散布	—

- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空袋は圃場等に放置せず、環境に影響がないよう適切に処理してください。●防除日誌を記帳しましょう。